



2010

Quand une cause de diarrhée chronique en cache une autre ou quand les étiologies de diarrhée s'entremêlent ...

Gilles Macaigne (1), Florence Harnois (1), Jean-François Boivin (2), Sadek Cheiab (1), Georges Bonyhai (2), Claude Chayette (1). Services d'hépatogastroentérologie (1) et d'anatomo-pathologie (2), Hôpital de Lagny-Marne-la-Vallée, 77 405 Lagny-sur-Marne Cedex. France.

Un homme de 55 ans consultait en juillet 2007 pour une diarrhée faite de 2 à 3 selles quotidiennes non formées évoluant depuis 2 ans avec perte de 15 kilos sans véritable AEG et douleurs abdominales non spécifiques sans signe d'appel extra-digestif. Sur le bilan biologique initial, il était noté une discrète hypo-albuminémie à 33g/l, une hypocholestérolémie, une diminution du TP 55% et une cytolyse hépatique avec un taux sérique d'ALAT inférieur à 2 fois la limite supérieure de la normale. Il n'y avait par ailleurs ni d'anémie et la glycémie était normale. Il présentait comme principal antécédent une notion d'atrophie pancréatique connue depuis des années et jusque-là non explorée. Il était alors hospitalisé dans le service pour la prise en charge de cette diarrhée chronique avec syndrome carenciel biologique. . .

[Fermer la fenêtre](#)