

Etiologies des pancréatites aiguës. Etude prospective chez 78 patients consécutifs.

Cassandra Megariotis, Philippe Lavau, David Foissey, Patrice Gallon, Fabien Lambiotte, Jacques-Francois Crinquette, Philippe Gower, Dominique Hanon, Claudine Gamblin, Bernadette Thielmans, Marc Doutriaux, Jean-Luc Chagnon, Luc Desprets, Vincent Lemaitre, Philippe Vanhille, Philippe Cuingnet, Arnaud Boruchowicz.
Centre Hospitalier de Valenciennes.

A notre connaissance peu d'études épidémiologiques ont été consacrées en France à la pancréatite aiguë (PA). La lithiase biliaire était la première cause dans un travail effectué à Nice par Maes et al (1). La deuxième cause était l'alcool avec une récurrence dans ce groupe observé chez 18% des malades. Après réalisation d'un bilan exhaustif le taux de pancréatite idiopathique était de 6,6%.

But de l'étude : Etudier prospectivement l'étiologie des PA chez les patients hospitalisés au centre hospitalier de Valenciennes entre le 01/05/00 et le 30/02/01.

Méthodes : Tous les services de l'hôpital ont été contactés pour participer à l'étude. Chaque dossier a été revu par un médecin enquêteur (CM). Une échographie, un scanner et un bilan biologique étaient systématiquement réalisés. Une échoendoscopie et une IRM étaient proposées en l'absence d'étiologie. Le cathétérisme rétrograde endoscopique des voies biliaires n'était envisagé qu'en cas d'incertitude sur l'interprétation des examens non invasifs ou en cas de récurrence de pancréatite.

Résultats : 78 patients hospitalisés ont présenté 86 épisodes de pancréatite aiguë. Les étiologies étaient les suivantes : alcool (n=34), lithiase (n=17), tumeurs (n=3), post-opératoires (n=3), médicamenteuses (n=3), lésions canalaire (n=3), hyperparathyroïdie (n=2), post-cathétérisme (n=1), infectieuse (n=1). Chez neuf patients (12,9%) la pancréatite était initialement idiopathique. Dans ce groupe 1) une récurrence permettait le diagnostic d'adénocarcinome, d'ectasie canalaire mucineuse et de lithiase, 2) une pancréatite chronique était diagnostiquée à postériori chez un patient 3) un patient décédait 8 mois après la PA d'une pneumonie. Quatre patients étaient asymptomatiques à 7 mois. Deux patients étaient perdus de vue. Au total 26 récurrences de pancréatite ont été observées. La première cause était l'alcool (18/26). Trois patients âgés en moyenne de 74 ans sont décédés.

Conclusion :

- 1) L'alcool était la première cause de PA et de pancréatite récidivante,
- 2) Avec des examens de routine le taux de pancréatite idiopathique était de 12 %.

1- Maes et al. Extensive aetiological investigations in acute pancreatitis : results of a 1-year prospective study.

Eur J Gastroenterol Hepatol 1999, 11 : 891-6.

[Résumé sur Medline PubMed :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10514123&dopt=Abstract]