

ORIGINAL ARTICLE

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China

W. Guan, Z. Ni, Yu Hu, W. Liang, C. Ou, J. He, L. Liu, H. Shan, C. Lei, D.S.C. Hui, B. Du, L. Li, G. Zeng, K.-Y. Yuen, R. Chen, C. Tang, T. Wang, P. Chen, J. Xiang, S. Li, Jin-lin Wang, Z. Liang, Y. Peng, L. Wei, Y. Liu, Ya-hua Hu, P. Peng, Jian-ming Wang, J. Liu, Z. Chen, G. Li, Z. Zheng, S. Qiu, J. Luo, C. Ye, S. Zhu, and N. Zhong, for the China Medical Treatment Expert Group for Covid-19*

This article was published on February 28, 2020, and last updated on March 6, 2020, at NEJM.org.

Caractéristiques chinoises

Analyse à partir de 1099 patients confirmés Covid + (552 hôpitaux, 30 provinces, jusqu'au 29/1/20).

Le critère d'évaluation principal combiné : admission en soins intensifs, la ventilation assistée ou le décès.

Age médian : 47 ans

H/F : 58,1/41,9%

67 patients avec le critère composite principal soit 6.1% dont :

- 5% en soins intensifs
- 2.3% avec ventilation assistée
- 1,4% de décès.

1,9% de contacts avec des animaux

Parmi les non résidents de Wuhan, 72.3% ont eu des contacts avec des habitants de Wuhan, dont 31.3% qui ont visité la ville

Caractéristiques cliniques

- Fièvre 43,8% à l'admission et 88,7% durant l'hospitalisation
- Toux 67,8%
- Diarrhée 3,8%

Incubation médiane : 4 jours (IQR 2-7)

En TDM thoracique, aspect en verre dépoli 56,4%

Absence d'anomalie pulmonaire constatée en RT ou TDM thoracique 17,9% (157/877) en l'absence de symptômes sévères et chez 2,9% (5/173) des cas graves.

Sur le plan biologique : lymphopénie chez 83,2% des patients à l'admission.

Characteristic	All Patients (N = 1099)	Disease Severity		Presence of Primary Composite End Point†	
		Nonsevere (N = 926)	Severe (N = 173)	Yes (N = 67)	No (N = 1032)
Age					
Median (IQR) — yr	47.0 (35.0–58.0)	45.0 (34.0–57.0)	52.0 (40.0–65.0)	63.0 (53.0–71.0)	46.0 (35.0–57.0)
Distribution — no./total no. (%)					
0–14 yr	9/1011 (0.9)	8/848 (0.9)	1/163 (0.6)	0	9/946 (1.0)
15–49 yr	557/1011 (55.1)	490/848 (57.8)	67/163 (41.1)	12/65 (18.5)	545/946 (57.6)
50–64 yr	292/1011 (28.9)	241/848 (28.4)	51/163 (31.3)	21/65 (32.3)	271/946 (28.6)
≥65 yr	153/1011 (15.1)	109/848 (12.9)	44/163 (27.0)	32/65 (49.2)	121/946 (12.8)
Female sex — no./total no. (%)	459/1096 (41.9)	386/923 (41.8)	73/173 (42.2)	22/67 (32.8)	437/1029 (42.5)
Smoking history — no./total no. (%)					
Never smoked	927/1085 (85.4)	793/913 (86.9)	134/172 (77.9)	44/66 (66.7)	883/1019 (86.7)
Former smoker	21/1085 (1.9)	12/913 (1.3)	9/172 (5.2)	5/66 (7.6)	16/1019 (1.6)
Current smoker	137/1085 (12.6)	108/913 (11.8)	29/172 (16.9)	17/66 (25.8)	120/1019 (11.8)
Exposure to source of transmission within past 14 days — no./total no.					
Living in Wuhan	483/1099 (43.9)	400/926 (43.2)	83/173 (48.0)	39/67 (58.2)	444/1032 (43.0)
Contact with wildlife	13/687 (1.9)	10/559 (1.8)	3/128 (2.3)	1/41 (2.4)	12/646 (1.9)
Recently visited Wuhan‡	193/616 (31.3)	166/526 (31.6)	27/90 (30.0)	10/28 (35.7)	183/588 (31.1)
Had contact with Wuhan residents‡	442/611 (72.3)	376/522 (72.0)	66/89 (74.2)	19/28 (67.9)	423/583 (72.6)
Median incubation period (IQR) — days§	4.0 (2.0–7.0)	4.0 (2.8–7.0)	4.0 (2.0–7.0)	4.0 (1.0–7.5)	4.0 (2.0–7.0)
Fever on admission					
Patients — no./total no. (%)	473/1081 (43.8)	391/910 (43.0)	82/171 (48.0)	24/66 (36.4)	449/1015 (44.2)
Median temperature (IQR) — °C	37.3 (36.7–38.0)	37.3 (36.7–38.0)	37.4 (36.7–38.1)	36.8 (36.3–37.8)	37.3 (36.7–38.0)
Distribution of temperature — no./total no. (%)					
<37.5°C	608/1081 (56.2)	519/910 (57.0)	89/171 (52.0)	42/66 (63.6)	566/1015 (55.8)
37.5–38.0°C	238/1081 (22.0)	201/910 (22.1)	37/171 (21.6)	10/66 (15.2)	228/1015 (22.5)
38.1–39.0°C	197/1081 (18.2)	160/910 (17.6)	37/171 (21.6)	11/66 (16.7)	186/1015 (18.3)
>39.0°C	38/1081 (3.5)	30/910 (3.3)	8/171 (4.7)	3/66 (4.5)	35/1015 (3.4)
Fever during hospitalization					
Patients — no./total no. (%)	975/1099 (88.7)	816/926 (88.1)	159/173 (91.9)	59/67 (88.1)	916/1032 (88.8)
Median highest temperature (IQR) — °C	38.3 (37.8–38.9)	38.3 (37.8–38.9)	38.5 (38.0–39.0)	38.5 (38.0–39.0)	38.3 (37.8–38.9)
<37.5°C	92/926 (9.9)	79/774 (10.2)	13/152 (8.6)	3/54 (5.6)	89/872 (10.2)
37.5–38.0°C	286/926 (30.9)	251/774 (32.4)	35/152 (23.0)	20/54 (37.0)	266/872 (30.5)
38.1–39.0°C	434/926 (46.9)	356/774 (46.0)	78/152 (51.3)	21/54 (38.9)	413/872 (47.4)
>39.0°C	114/926 (12.3)	88/774 (11.4)	26/152 (17.1)	10/54 (18.5)	104/872 (11.9)

Symptoms — no. (%)					
Conjunctival congestion	9 (0.8)	5 (0.5)	4 (2.3)	0	9 (0.9)
Nasal congestion	53 (4.8)	47 (5.1)	6 (3.5)	2 (3.0)	51 (4.9)
Headache	150 (13.6)	124 (13.4)	26 (15.0)	8 (11.9)	142 (13.8)
Cough	745 (67.8)	623 (67.3)	122 (70.5)	46 (68.7)	699 (67.7)
Sore throat	153 (13.9)	130 (14.0)	23 (13.3)	6 (9.0)	147 (14.2)
Sputum production	370 (33.7)	309 (33.4)	61 (35.3)	20 (29.9)	350 (33.9)
Fatigue	419 (38.1)	350 (37.8)	69 (39.9)	22 (32.8)	397 (38.5)
Hemoptysis	10 (0.9)	6 (0.6)	4 (2.3)	2 (3.0)	8 (0.8)
Shortness of breath	205 (18.7)	140 (15.1)	65 (37.6)	36 (53.7)	169 (16.4)
Nausea or vomiting	55 (5.0)	43 (4.6)	12 (6.9)	3 (4.5)	52 (5.0)
Diarrhea	42 (3.8)	32 (3.5)	10 (5.8)	4 (6.0)	38 (3.7)
Myalgia or arthralgia	164 (14.9)	134 (14.5)	30 (17.3)	6 (9.0)	158 (15.3)
Chills	126 (11.5)	100 (10.8)	26 (15.0)	8 (11.9)	118 (11.4)
Signs of infection — no. (%)					
Throat congestion	19 (1.7)	17 (1.8)	2 (1.2)	0	19 (1.8)
Tonsil swelling	23 (2.1)	17 (1.8)	6 (3.5)	1 (1.5)	22 (2.1)
Enlargement of lymph nodes	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.6)	1 (1.5)	1 (0.1)
Rash	2 (0.2)	0	2 (1.2)	0	2 (0.2)
Coexisting disorder — no. (%)					
Any	261 (23.7)	194 (21.0)	67 (38.7)	39 (58.2)	222 (21.5)
Chronic obstructive pulmonary disease	12 (1.1)	6 (0.6)	6 (3.5)	7 (10.4)	5 (0.5)
Diabetes	81 (7.4)	53 (5.7)	28 (16.2)	18 (26.9)	63 (6.1)
Hypertension	165 (15.0)	124 (13.4)	41 (23.7)	24 (35.8)	141 (13.7)
Coronary heart disease	27 (2.5)	17 (1.8)	10 (5.8)	6 (9.0)	21 (2.0)
Cerebrovascular disease	15 (1.4)	11 (1.2)	4 (2.3)	4 (6.0)	11 (1.1)
Hepatitis B infection¶	23 (2.1)	22 (2.4)	1 (0.6)	1 (1.5)	22 (2.1)
Cancer¶	10 (0.9)	7 (0.8)	3 (1.7)	1 (1.5)	9 (0.9)
Chronic renal disease	8 (0.7)	5 (0.5)	3 (1.7)	2 (3.0)	6 (0.6)
Immunodeficiency	2 (0.2)	2 (0.2)	0	0	2 (0.2)

Variable	All Patients (N= 1099)	Disease Severity		Presence of Composite Primary End Point	
		Nonsevere (N=926)	Severe (N= 173)	Yes (N= 67)	No (N= 1032)
Radiologic findings					
Abnormalities on chest radiograph — no./total no. (%)	162/274 (59.1)	116/214 (54.2)	46/60 (76.7)	30/39 (76.9)	132/235 (56.2)
Ground-glass opacity	55/274 (20.1)	37/214 (17.3)	18/60 (30.0)	9/39 (23.1)	46/235 (19.6)
Local patchy shadowing	77/274 (28.1)	56/214 (26.2)	21/60 (35.0)	13/39 (33.3)	64/235 (27.2)
Bilateral patchy shadowing	100/274 (36.5)	65/214 (30.4)	35/60 (58.3)	27/39 (69.2)	73/235 (31.1)
Interstitial abnormalities	12/274 (4.4)	7/214 (3.3)	5/60 (8.3)	6/39 (15.4)	6/235 (2.6)
Abnormalities on chest CT — no./total no. (%)	840/975 (86.2)	682/808 (84.4)	158/167 (94.6)	50/57 (87.7)	790/918 (86.1)
Ground-glass opacity	550/975 (56.4)	449/808 (55.6)	101/167 (60.5)	30/57 (52.6)	520/918 (56.6)
Local patchy shadowing	409/975 (41.9)	317/808 (39.2)	92/167 (55.1)	22/57 (38.6)	387/918 (42.2)
Bilateral patchy shadowing	505/975 (51.8)	368/808 (45.5)	137/167 (82.0)	40/57 (70.2)	465/918 (50.7)
Interstitial abnormalities	143/975 (14.7)	99/808 (12.3)	44/167 (26.3)	15/57 (26.3)	128/918 (13.9)
Laboratory findings					
Median Pao ₂ :Fio ₂ ratio (IQR)†	3.9 (2.9–4.7)	3.9 (2.9–4.5)	4.0 (2.8–5.2)	2.9 (2.2–5.4)	4.0 (3.1–4.6)
White-cell count					
Median (IQR) — per mm ³	4700 (3500– 6000)	4900 (3800–6000)	3700 (3000–6200)	6100 (4900– 11,100)	4700 (3500– 5900)
Distribution — no./total no. (%)					
>10,000 per mm ³	58/978 (5.9)	39/811 (4.8)	19/167 (11.4)	15/58 (25.9)	43/920 (4.7)
<4000 per mm ³	330/978 (33.7)	228/811 (28.1)	102/167 (61.1)	8/58 (13.8)	322/920 (35.0)
Lymphocyte count					
Median (IQR) — per mm ³	1000 (700–1300)	1000 (800–1400)	800 (600–1000)	700 (600–900)	1000 (700–1300)
Distribution — no./total no. (%)					
<1500 per mm ³	731/879 (83.2)	584/726 (80.4)	147/153 (96.1)	50/54 (92.6)	681/825 (82.5)

Platelet count					
Median (IQR) — per mm ³	168,000 (132,000–207,000)	172,000 (139,000–212,000)	137,500 (99,000–179,500)	156,500 (114,200–195,000)	169,000 (133,000–207,000)
Distribution — no./total no. (%)					
<150,000 per mm ³	315/869 (36.2)	225/713 (31.6)	90/156 (57.7)	27/58 (46.6)	288/811 (35.5)
Median hemoglobin (IQR) — g/dl‡	13.4. (11.9–14.8)	13.5 (12.0–14.8)	12.8 (11.2–14.1)	12.5 (10.5–14.0)	13.4 (12.0–14.8)
Distribution of other findings — no./total no. (%)					
C-reactive protein ≥10 mg/liter	481/793 (60.7)	371/658 (56.4)	110/135 (81.5)	41/45 (91.1)	440/748 (58.8)
Procalcitonin ≥0.5 ng/ml	35/633 (5.5)	19/516 (3.7)	16/117 (13.7)	12/50 (24.0)	23/583 (3.9)
Lactate dehydrogenase ≥250 U/liter	277/675 (41.0)	205/551 (37.2)	72/124 (58.1)	31/44 (70.5)	246/631 (39.0)
Aspartate aminotransferase >40 U/liter	168/757 (22.2)	112/615 (18.2)	56/142 (39.4)	26/52 (50.0)	142/705 (20.1)
Alanine aminotransferase >40 U/liter	158/741 (21.3)	120/606 (19.8)	38/135 (28.1)	20/49 (40.8)	138/692 (19.9)
Total bilirubin >17.1 μmol/liter	76/722 (10.5)	59/594 (9.9)	17/128 (13.3)	10/48 (20.8)	66/674 (9.8)
Creatine kinase ≥200 U/liter	90/657 (13.7)	67/536 (12.5)	23/121 (19.0)	12/46 (26.1)	78/611 (12.8)
Creatinine ≥133 μmol/liter	12/752 (1.6)	6/614 (1.0)	6/138 (4.3)	5/52 (9.6)	7/700 (1.0)
D-dimer ≥0.5 mg/liter	260/560 (46.4)	195/451 (43.2)	65/109 (59.6)	34/49 (69.4)	226/511 (44.2)
Minerals§					
Median sodium (IQR) — mmol/liter	138.2 (136.1–140.3)	138.4 (136.6–140.4)	138.0 (136.0–140.0)	138.3 (135.0–141.2)	138.2 (136.1–140.2)
Median potassium (IQR) — mmol/liter	3.8 (3.5–4.2)	3.9 (3.6–4.2)	3.8 (3.5–4.1)	3.9 (3.6–4.1)	3.8 (3.5–4.2)
Median chloride (IQR) — mmol/liter	102.9 (99.7–105.6)	102.7 (99.7–105.3)	103.1 (99.8–106.0)	103.8 (100.8–107.0)	102.8 (99.6–105.3)

Variable	All Patients (N=1099)	Disease Severity		Presence of Composite Primary End Point	
		Nonsevere (N=926)	Severe (N=173)	Yes (N=67)	No (N=1032)
Complications					
Septic shock — no. (%)	12 (1.1)	1 (0.1)	11 (6.4)	9 (13.4)	3 (0.3)
Acute respiratory distress syndrome — no. (%)	37 (3.4)	10 (1.1)	27 (15.6)	27 (40.3)	10 (1.0)
Acute kidney injury — no. (%)	6 (0.5)	1 (0.1)	5 (2.9)	4 (6.0)	2 (0.2)
Disseminated intravascular coagulation — no. (%)	1 (0.1)	0	1 (0.6)	1 (1.5)	0
Rhabdomyolysis — no. (%)	2 (0.2)	2 (0.2)	0	0	2 (0.2)
Physician-diagnosed pneumonia — no./total no. (%)	972/1067 (91.1)	800/894 (89.5)	172/173 (99.4)	63/66 (95.5)	909/1001 (90.8)
Median time until development of pneumonia (IQR) — days*					
After initial Covid-19 diagnosis	0.0 (0.0–1.0)	0.0 (0.0–1.0)	0.0 (0.0–2.0)	0.0 (0.0–3.5)	0.0 (0.0–1.0)
After onset of Covid-19 symptoms	3.0 (1.0–6.0)	3.0 (1.0–6.0)	5.0 (2.0–7.0)	4.0 (0.0–7.0)	3.0 (1.0–6.0)
Treatments					
Intravenous antibiotics — no. (%)	637 (58.0)	498 (53.8)	139 (80.3)	60 (89.6)	577 (55.9)
Oseltamivir — no. (%)	393 (35.8)	313 (33.8)	80 (46.2)	36 (53.7)	357 (34.6)
Antifungal medication — no. (%)	31 (2.8)	18 (1.9)	13 (7.5)	8 (11.9)	23 (2.2)
Systemic glucocorticoids — no. (%)	204 (18.6)	127 (13.7)	77 (44.5)	35 (52.2)	169 (16.4)
Oxygen therapy — no. (%)	454 (41.3)	331 (35.7)	123 (71.1)	59 (88.1)	395 (38.3)
Mechanical ventilation — no. (%)	67 (6.1)	0	67 (38.7)	40 (59.7)	27 (2.6)
Invasive	25 (2.3)	0	25 (14.5)	25 (37.3)	0
Noninvasive	56 (5.1)	0	56 (32.4)	29 (43.3)	27 (2.6)
Use of extracorporeal membrane oxygenation — no. (%)	5 (0.5)	0	5 (2.9)	5 (7.5)	0
Use of continuous renal-replacement therapy — no. (%)	9 (0.8)	0	9 (5.2)	8 (11.9)	1 (0.1)
Use of intravenous immune globulin — no. (%)	144 (13.1)	86 (9.3)	58 (33.5)	27 (40.3)	117 (11.3)
Admission to intensive care unit — no. (%)	55 (5.0)	22 (2.4)	33 (19.1)	55 (82.1)	0
Median length of hospital stay (IQR) — days†	12.0 (10.0–14.0)	11.0 10.0–13.0)	13.0 (11.5–17.0)	14.5 (11.0–19.0)	12.0 (10.0–13.0)

Clinical outcomes at data cutoff — no. (%)					
Discharge from hospital	55 (5.0)	50 (5.4)	5 (2.9)	1 (1.5)	54 (5.2)
Death	15 (1.4)	1 (0.1)	14 (8.1)	15 (22.4)	0
Recovery	9 (0.8)	7 (0.8)	2 (1.2)	0	9 (0.9)
Hospitalization	1029 (93.6)	875 (94.5)	154 (89.0)	51 (76.1)	978 (94.8)

* For the development of pneumonia, data were missing for 347 patients (31.6%) regarding the time since the initial diagnosis and for 161 patients (14.6%) regarding the time since symptom onset.

† Data regarding the median length of hospital stay were missing for 136 patients (12.4%).